
Pose de Mini Vis

L'établissement du diagnostic grâce aux mesures prises sur vos radiographies, empreintes et photographies a révélé la nécessité de la pose d'une Mini Vis afin de pouvoir réaliser les objectifs de votre traitement.

Je souhaite partager avec vous les éléments suivants afin de pouvoir vous aider à mieux appréhender la suite de votre traitement :

- Préalablement à la pose de la Mini Vis une anesthésie locale est réalisée
- La pose est un acte parfaitement indolore et plutôt rapide (1 minute environ)
- Une fois la pose terminée, l'effet de l'anesthésie se dissipe après 2h.
- Il est conseillé de prendre du paracétamol 1H avant l'intervention et toutes les 4h après la pose pendant 2 jours.

- La Vis est connectée le jour même avec les bagues (le but étant de réduire le risque de mobilité)
- Une fois posée la vis doit être immobile
- Chez 5% à 7% des patients la vis devient mobile. Dans ce cas elle doit être déposée et reposée car elle ne pourra pas être connectée aux bagues pour déplacer les dents dans le sens souhaité.
- Le plus gros facteur de risque de mobilité est le manque d'hygiène autour de la Vis. Un nettoyage minutieux est essentiel pour permettre la stabilité de la vis posée.

Meilleures Salutations